

عيادة كنس ين غتون

حجز وتأكييد موعدك

سوف يقبل حجز العملية الجراحية. إجراء الهاتف من جانب المرأة التي تطلب عن طريق حجز جميع المواعيد إذا كان هذا هو الحال، يجب أن تكون المرأة التي تطلب حجز لغوي. إذا كان هناك ثمة المواعيد من قبل طرف ثالث فقط ية حاضرة عندما يتم الاتصال. العملية الجراح

يرجى أن يكون متوفر لديك رقم تأمين الرعاية الصحية وتاريخ أول يوم من آخر فترة حيض طبي عية عند حالة طبية أو مرض معدى أو حساسية للأدوية لكي نتأكد من أي إذا كنت تعانين من من المهم جداً أن تخبرينا بالاتصال. من تقديم الرعاية المناسبة لك.

سوف يتطلب منك أن تخضعين لفحص دم قبل حضورك إلى العيادة. سوف ترتب العيادة هذا الأمر لك.

إذا كنت لا تعرفين متى كانت عادتك الشهرية (الأخيرة) الحيض (أو إذا كانت تزيد مدة حملك على 12 أسبوعاً أو إذا حصل الموجات فوق الصوتية عليك قبل موعدك. كنت تسكنين خارج منطقة كلغاري، سوف تكون هناك حاجة لإجراء ف يمكن ترتب هذا الأمر في هذه العيادة أو عن طريق طبيبك.

تأكييد الموعد

يجب عليك الاتصال في ذلك التاريخ تاريخ معين للاتصال بنا في ذلك التاريخ وتأكييد موعدك. نحدد لك وسوف مخدمات والتعاملات التي عليك اتباعها قبل إجراء فيما يلي القبل الظهر وإلا سوف يلغى موعدك تلقائياً. العملية الجراحية.

- وف تبقيين من العملية تأخذ يومين س إذا كنت لا يمكنك أخذ الطعام أو الشراب لمدة 5 ساعات السابقة لموعدك. **ي هذه إذا لم تتبعين، ليس عليك الصيام في اليوم الأول، ولكن يجب عليك أو تصوم في اليوم الثاني.**
- **تعمل ي مام، سوف يتم إلغاء موعدك.**
- سوف تصبحين ن عساة في داخل الوريدي. الذي يعطى سوف يتم إجراء العملية تحت التخدير الموضعي تكوني نائمة تماماً. قد لا تكونك
- لية ولا يمكنك قد تسبب الأدوية ضعف في القدرة العقلية ولهذا لا يمكنك القيادة لمدة 24 ساعة بعد إجراء العم إسخدام وسائل النقل العام أو المشي إلا إذا رافقك أحد الأشخاص.
- يجب أن ي حضر الشخص الذي سوف يرافقك في منزلك بالسيارة إلى أن أحد الأشخاص سوف يوصلك أكدي من 00 مساءً. 4 موعد لا يتجاوز الساعة
- طفال في العيادة. يمكنك أن تجلب شخص واحد إلى العيادة معك. لا يسمح لل 15 أسبوعاً، سوف تبقيين في العيادة لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. إذا تقل عن إذا كنت حامل لمدة كنت حامل لمدة 15 أسبوعاً أو أكثر، قد تكون في العيادة لمدة تتراوح بين أربع وخمس ساعات وقد يحتاج عن دم تقومين بحجز موعدك، ساعتين خلال كل موعد. لمدة ادة الأمر أن نراك خلال مواعيد وأن تبقي في العي سوف تعرف موظفة الإسقبال في العيادة مدى وقت بقائك في العيادة.
- الدوش في الليلة السابقة أو في الصباح. عمل ي إس تحمي أو
- لا تتعطري أو تستخدمي الكولونيا.
- ن الجوارب. ارتدي الملابس الفضفاضة وقميص قصير الأكمام وزوج م إس تمري في أخذ أية أدوية موصوفة لك واجلب أدوية معك.
- لا تأخذي الأسبرين) حمض أسيتيل ساليسيليك (أو الكحول أو المخدرات التي يتداول بها في الشارع لمدة 24 ساعة قبل موعدك.
- إذا لم نتلقى فحص دمك في موعد لا يتجاوز يوم عمل يتك الجراحية، سوف يلغى موعدك.
- لبي بطاقة تأمين الرعاية الصحية معك وبطاقة موية تحمل صورة فوتوغرافية. لن يتم قبولك في العيادة إج بدون هذه البطاقات.

- إذا لم يكن عندك تأمين للرعاية الصحية وتودين أن تدفعي تكاليف العملية بنفسك فعليك دفع و ببطاقة الخصم وبطاقات التأمين التكاليف بالكامل قبل بدأ العملية. تقبل العيادة الدفع نقداً والحوالات.
- (وطرق منع الحمل للحالات Nuva Ring (وحلقة نوبا) EVRA patches نوفر اللولب الرحمي ورقعات إي فرا)
الطارية مقابل رسوم معينة.

مخاطر عملية الإجهاض

1. العدوى

في هي حوالي 1،0% إن احتمالية حدوث الالتهاب في الرحم (التهاب بطانة الرحم) الفصل الأول من الحمل و 4،0% في آلام الحوض والحمى تشمل أعراض الالتهاب أو الإصابة بالعدوى قد الفصل الثاني. والرائحة الكريهة. ويتم معالجة ذلك الحويوية، وفي بعض الأحيان بالسفط المتكرر. هناك احتمالية صغيرة بالمضادات بأن يكون من الضروري الدخول إلى المستشفى أو التوسيع والكشط أو من لعلاج من أجل إعطاء المضادات الحويوية في داخل الوريدي. أجل إجراء عملية جراحية أخرى.

2. الإجهاض غير الكامل

بعض أنسجة الإجهاض أنه قد تم إنهاء الحمل ولكن لا تزال الإجهاض غير الكامل يعنى متبقية في الرحم. تشمل أعراض النزيف وتكرر الجلطات الدموية وزيادة التشنجات وربما زيادة الإجهاض غير الكامل، العدوى. إذا حصلت هذه المضاعفات، لمستشفى. قد يتطلب الأمر السفط المتكرر أو التوسيع والكشط في العيادة أو

3. الإسمرار في الحمل أو فشل الإجهاض

إن الفشل في الإجهاض نادر وينجم عادةً عن الرحم ذو القرنين (أي المنقسم أو على شكل القلب) أو الحمل المتكرر أو الحمل للشخص ليس بإمكان الطبيب، في بعض الأحيان، إزالة الحمل. من المهم خارج الرحم. ية أن تعود إلى الذي سوف يخضع للعمل العيادة أو تذهب إلى طبيبه إذا كانت تشعر أنها لا تزال حامل ولم تأتي دورها في غضون 8 أسابيع بعد عملية (الشهري) إذا حصل ذلك، يمكن حجز موعد لإجراء محاولة أخرى، أو قد يحال الشخص إلى الإجهاض. لا يتم إنهاء الحمل للمستشفى. ارج الرحم (بالإجهاض وقد يتطلب عملية في البطن لإزالته. البوقى) أي خ

4. إنثقاب الرحم

عندما تمر أداة عبر جدار الرحم خلال إجراء العملية. وهو شيء يحصل إنثقاب في الرحم غير عادي ولكنه يحدث أن يكون خطير. ية الدموية أو المثانة أو الأوعية قد يسبب أذى في الأعضاء الداخلية مثل الأمعاء يشمل العلاج المراقبة أو تنظير البطن أو في حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى إستئصال الرحم (جراحة البطن).

5. تمزق عنق الرحم

إن سبب التمزق في عنق الرحم هي الأدوات التي تستخدم خلال العملية. قد يعالج (الموضعية أو الغرز) أي بالأدوية التمزق (التقريب) في عنق الرحم أو قد يتطلب ذلك النقل إلى المستشفى للترميم إذا كان التمزق شديداً.

6. إثارة الحساسية

أو أي التسكين أو اللاتكس سبب إثارة الحساسية التخدير الموضعي أو يكون قد إذا حصلت ردة مواد أخرى يحدث بها المريض.

طبية معيارية. إجراءات اساسة، يعالج الموظفون الطبيون المريض باسخدام فعل حس
إذا حصلت ردة فعل شديدة، ينقل المريض إلى
المستشفى.

7. **جلطات الدم المتراكمة في الرحم (أي تدمي الرحم)**
يحصل ذلك عندما يتم إنتاج جلطات الدم أسرع مما يكون بإمكان الرحم أن يخرجه،
ي إمتلاء الرحم بالدم. ويؤدي ذلك إلى
يكون العلاج بالسفطسوف يشعر المريض بالإنفاخ والتشنج الشديدي.
المتكرر إلى أن يتم إزالة الدم والجلطات من الرحم.

8. **النزف**
قد ينتج النزف أو النزيف الشديدي عن تمزق عنق الرحم أو الإنثقاب أو الأنسجة
الإعتلال أو المتبقية أو الوهن في الرحم أو التفتق
قد يتطلب النزف المعالجة بالأدوية. الخثري أو شذوذات أخرى في الرحم أو المشيمة
قد يكون النقل والسفط المتكرر في العيادة.
إلى المستشفى ضروري من أجل التسوية والكشط أو أي عملية جراحية أخرى وقد
يتطلب نقل الدم.

9. **الموت**
كاد يذكر. ينبغي مقارنة هذا الخطر مع خطر الموت من لا يإن خطر الموت من الإجهاض
بإثني عشر مرة من خطر الإجهاض المبكر. أكثر خطراً وهو المتابعة في الحمل حتى الولادة
إن سن الحمل هو أهم عامل خطر وإن نسبة الوفيات أقل في الفصل
ف والعدوى ويسبب هذه الوفيات النزال حمل مقارنةً بالفصل الثاني منه. الأول من
وإلى حد أقل، التخيير لأن التخيير العام
على نطاق واسع. ويقل استخداً أصح أكثر أمناً

بالكوويل 2009- وايلي-المعملومات من إدارة الحمل غير المقصود أو غير الطبي عي